

Effectmeting van psychofarmaca

Mensen met een verstandelijke beperking en hun familie hebben onderzocht wat voor hen belangrijk is bij het gebruik van medicijnen voor psychische problemen en moeilijk verstaanbaar gedrag. Door samen met de behandelaar te kijken naar de effecten van deze medicijnen op bepaalde gebieden, wordt rekening gehouden met hun wensen voor de behandeling. Aangeraden wordt om hierbij voor elk gebied geschikte meetinstrumenten te gebruiken. De behandelaar kan hierover informatie opvragen bij: research.cvbvp@ggzdrenthe.nl

Gedrag:

- Een meetinstrument bestaande uit vragen over gedrags- en psychische symptomen die ingevuld moet worden door begeleiders of naasten van mensen met mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen.
- Een meetinstrument bestaande uit een vragenlijst over psychische symptomen die door mensen met een licht verstandelijke beperking zelf ingevuld moet worden.

Bijwerkingen van medicatie

- Een meetinstrument bestaande uit een vragenlijst naar bijwerkingen van psychofarmaca die de verpleegkundige invult tijdens een medicatiecontrole van de client.
- Een meetinstrument bestaande uit een vragenlijst naar bijwerkingen bij gebruik van een bepaalde soort van medicatie (antipsychotica) die mensen met een licht verstandelijke beperking zelf moeten invullen.

Kwaliteit van leven

- Een meetinstrument bestaande uit vragenlijsten die ingevuld worden door een getrainde orthopedagoog of begeleider tijdens een interview met de persoon met een licht verstandelijke beperking zelf of met een naaste die de persoon met een matige of ernstige verstandelijke beperking goed kent.

Dagelijks functioneren

- Vragenlijst over het daadwerkelijk lichamelijk en psychisch functioneren en een aantal vragen over de ervaren gezondheid. Er zijn zelf-invul versies en naasten versies.

Draaglast voor familie en verzorgers:

- Het kan zwaar zijn om voor iemand met psychische ziekten of moeilijk verstaanbaar gedrag te zorgen. De verzorger of familielid kan daar zelf ook ziek van worden, waardoor deze persoon niet meer kan zorgen. Er is geen Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar om dit te meten.