

Voorbeelden van de 'Vraag van Vandaag' uit het Richtlijnspeel, met feedback beantwoording en toelichting. Via de knop Meer informatie in de toelichting klikt men door naar de richtlijn.

Om deze vraag in je browser te bekijken, klik [hier](#)
Klik op de letter van het antwoord dat volgens jou juist is

Vraag van Vandaag

[Opvoeding en leefstijl > Opvoedondersteuning \(2013\)](#)

Thijs van 4 jaar heeft overgewicht. Het contact met zijn ouders hierover start moeizaam. Na een telefoongesprek ziet moeder de meerwaarde van een consult in en spreek je af dat ze een eet- en beweegdagboek gaan invullen. Tijdens het consult blijkt dit niet gebeurd te zijn. Wat is je reactie?

A

 Ter plekke eet- en beweegpatroon vaststellen

B


 Moeder erop aanspreken

C

 Consult verschuiven naar later moment

D

 Oorzaak bevragen



Vraag van Vandaag

[Opvoeding en leefstijl > Opvoedondersteuning \(2013\)](#)

✓ Sluit toelichting

Gezien eerdere moeite in het contact is het in deze situatie handig om ter plekke de eet- en beweegpatronen met elkaar vast te stellen. Grote kans dat je later in het gesprek er achter komt waarom het invullen niet gelukt is. Door moeder aan te spreken of de oorzaak te bevragen kan je snel weerstand oproepen, je kunt het nu beter licht houden. Als je direct een andere consult inplant breek je met het principe van partnerschap en gelijkheid.

[Lees meer in de richtlijn.](#)

Meer informatie

Vraag van Vandaag

[Medisch > Huidafwijkingen \(2012\)](#)

Wat zie je op onderstaande foto?

Is de foto niet goed zichtbaar vanuit de e-mail? Open de vraag dan in je browser



- A** Aardbeivlek
- B** Wijnvlek
- C** Cafe au lait vlek




Vraag van Vandaag

[Medisch > Huidafwijkingen \(2012\)](#)



Hoe werd deze vraag beantwoord?
Wat zie je op onderstaande foto?
Is de foto niet goed zichtbaar vanuit de e-mail? Open de vraag dan in je browser



- A** Aardbeivlek
- B** Wijnvlek
- C** Cafe au lait vlek



Vraag van Vandaag

[Medisch > Huidafwijkingen \(2012\)](#)



✓ Sluit toelichting

Roze tot paarse verkleuring. Vormen: wijnvlek (meest voorkomende, ook wel naevus flammeus), ooievaarsbeet, veneuze, arterioveneuze en lymatische vaatmalformaties. Is veelal bij de geboorte aanwezig en groeit met lichaam mee, i.t.t. de aardbeivlek, die meestal bij de geboorte niet zichtbaar is en explosief groeit.

[Lees meer over wijnvlekken.](#)

Meer informatie

Om deze vraag in je browser te bekijken, klik [hier](#).
Klik op de letter van het antwoord dat volgens jou juist is

Vraag van Vandaag

[Medisch > Lengtegroei \(2019\)](#)

Bij een zuigeling wordt de lengte gemeten. Hoe moet de positie van het hoofd zijn?

- A** Gedraaid (zuigeling kijkt opzij)
- B** Recht (zuigeling kijkt omhoog) tegen de hoofdplank van de meetbalk
- C** Tegen de hoofdplank van de meetbalk met de kin op de borst




Vraag van 27/04/2020

[Medisch > Lengtegroei \(2019\)](#)



Hoe werd deze vraag beantwoord?

Bij een zuigeling wordt de lengte gemeten. Hoe moet de positie van het hoofd zijn?



Vraag van 27/04/2020

[Medisch > Lengtegroei \(2019\)](#)



✓ Sluit toelichting

Materiaal: Voor zuigelingen en peuters die nog niet zelfstandig kunnen staan: een meetbak met centimeterverdeling in de lengterichting en met een vaste hoofdplank en een verschuifbare voetenplank.

Metten van lengtegroei: Een persoon houdt het ontholte hoofd van het kind tegen de hoofdplank gefixeerd terwijl een ander persoon de beide knieën van het kind tegen de onderplank drukt en met de andere hand de voetenplank tegen de blote voeten aanschuift. De voeten moeten hierbij haaks op het onderbeen staan. Het hoofd recht tegen de bovenplank houden, dus niet met de kin op de borst. De lengte wordt afgelezen tot op een millimeter nauwkeurig.

Meer informatie

Om deze vraag in je browser te bekijken, klik [hier](#)
Klik op de letter van het antwoord dat volgens jou juist is

Vraag van Vandaag

(psycho)Sociaal > Depressie (2016)

Je spreekt met de moeder van een peuter. Zij vertelt dat haar dochter de afgelopen week somberder oogt dan ze gewend is. Daarnaast slaapt ze slecht en speelt ze heel weinig zelfstandig. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

- A** Haar dochter heeft depressieve klachten
- B** Haar dochter heeft een depressie



Vraag van Vandaag

(psycho)Sociaal > Depressie (2016)



Hoe werd deze vraag beantwoord?

Je spreekt met de moeder van een peuter. Zij vertelt dat haar dochter de afgelopen week somberder oogt dan ze gewend is. Daarnaast slaapt ze slecht en speelt ze heel weinig zelfstandig. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

A

100%

B

0%

A

Haar dochter heeft depressieve klachten



Vraag van Vandaag

(psycho)Sociaal > Depressie (2016)



Sluit toelichting

Bij depressieve klachten is er sprake van een aantal klachten die bij een depressie horen, zoals een sombere stemming, nergens zin in hebben, slecht slapen, slecht eten, slechte concentratie, suïcidale gedachten etc., zonder dat er voldaan wordt aan de criteria voor het stellen van een depressie, namelijk minstens 2 weken een sombere stemming en daarnaast minstens 5 andere symptomen.

[Richtlijn Depressie](#)

Meer informatie

Om deze vraag in je browser te bekijken, klik [hier](#)
Klik op de letter van het antwoord dat volgens jou juist is

Vraag van Vandaag

[Het jonge kind](#) > [Excessief huilen \(2013\)](#)

In de eerste maanden is bij alle baby's een vergelijkbaar huilpatroon waar te nemen. Na de geboorte neemt de totale duur van het huilen toe. Wanneer bereikt dit een piek?

- A** Na 3 weken
- B** Na 6 tot 8 weken
- C** Na 8 tot 10 weken




Vraag van 20/04/2020

[Het jonge kind](#) > [Excessief huilen \(2013\)](#)



Hoe werd deze vraag beantwoord?

In de eerste maanden is bij alle baby's een vergelijkbaar huilpatroon waar te nemen. Na de geboorte neemt de totale duur van het huilen toe. Wanneer bereikt dit een piek?



A Na 3 weken

C

7%



B Na 6 tot 8 weken

Vraag van 20/04/2020

[Het jonge kind](#) > [Excessief huilen \(2013\)](#)



✓ Sluit toelichting

Na de geboorte neemt de totale duur van het huilen langzaam toe, tot rond de leeftijd van 6-8 weken een piek wordt bereikt die in onze samenleving gemiddeld 2-2,5 uur per dag is. Na deze periode neemt de duur van het huilen af tot vanaf ongeveer 12 weken voor de rest van het eerste jaar een stabiel niveau wordt bereikt van gemiddeld 1-1,5 uur per dag, met een accent op de avonduren.

[Richtlijn: Excessief huilen](#)

Meer informatie